

大腸癌

レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
SOX	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注d1	
SOX+BV	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
XELOX (Cape+OX)	ゼローダ	2000mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注d1	
XELOX+BV	ゼローダ	2000mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	オキサリプラチン	130mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
XELIRL	ゼローダ	別紙参照	経口投与d1~14	21日
	イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注d1	
XELIRI+BV	ゼローダ	別紙参照	経口投与d1~14	21日
	イリノテカン	200mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
XEIRI+Pmab	パニツムマブ	6mg/kg	点滴静注d1	21日
	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注d1	
	カペシタビン	C法	経口投与d1~14	
CPT-11	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
CPT-11 weekly	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1,8,15	28日
CPT-11+BV	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	アバスチン	5mg/kg	点滴静注d1,15	
CPT-11+Pmab	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1	14日
	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	

大腸癌

レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
CPT-11+S-1	イリノテカン	125mg/m ²	点滴静注d1,15	28日
	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~14	
CPT-11+S-1+Bv	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1	21日
	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~7	
	アバスタチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
CPT-11+S-1+Bv	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1	14日
	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~7	
	アバスタチン	5mg/kg	点滴静注d1	
CPT-11+S-1+Pmab	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1	14日
	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~7	
	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	
S-1+CPT + Cmob (biweekly)	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注d1、15	28日
	イリノテカン	100mg/m ²	点滴静注d1、15	
	S-1	別紙参照	経口投与d1~14	
Cape+Bv	ゼローダ	2000mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	アバスタチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
S-1+Bv	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~14	21日
	アバスタチン	7.5mg/kg	点滴静注d1	
S-1+Pmab	S-1	80mg/m ²	経口投与d1~7	14日
	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	
Pmab	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	14日
Cmob	アービタックス	250(400)mg/m ²	点滴静注d1	7日
Cmob (biweekly)	セツキシマブ	500mg/m ²	点滴静注d1	14日
mFOLFOX6	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
mFOLFOX6+Bv	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	急速静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスタチン	5mg/kg	点滴静注d1	
mFOLFOX6+Pmab	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	急速静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	
FOLFIRI	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	急速静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	

レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
FOLFIRI+BV	イリノテカン	150mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	急速静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスタチン	5mg/kg	点滴静注d1	
FOLFIRI+Pmab	イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	ベクティビックス	6mg/kg	点滴静注d1	
FOLFIRI+RAM	イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	サイラムザ	8mg/kg	点滴静注d1	
FOLFIRI+AFL	イリノテカン	180mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	400mg/m ²	急速静注d1	
	5-FU	2400mg/m ²	点滴静注d1	
	ザルトラップ	4mg/kg	点滴静注d1	
FOLFOXIRI	イリノテカン	165mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	3200mg/m ²	点滴静注d1	
FOLFOXIRI ± BV	イリノテカン	165mg/m ²	点滴静注d1	14日
	レボホリナート	200mg/m ²	点滴静注d1	
	オキサリプラチン	85mg/m ²	点滴静注d1	
	5-FU	3200mg/m ²	点滴静注d1	
	アバスタチン	5mg/kg	点滴静注d1	
TAS102 + BV	アバスタチン	5mg/kg	点滴静注d1、d14	28日
	ロンサーフ	35mg/m ² /回	経口内服d1~5、8~12	
パージェタ+ハーセプチン	パージェタ	420mg/body	点滴静注d1	21日
	ハーセプチン	6mg/kg	点滴静注d1	
オブジーボ+ヤーボイ	オブジーボ	360mg/body	点滴静注d1、22	42日
	ヤーボイ	1mg/kg	点滴静注d1	
フェスゴ	フェスゴMA	10mg/body	皮下注射d1	21日
	(フェスゴIN)	(15mg/body)		