

肝、膵、胆

膵、胆

| レジメン名 | 抗がん剤(商品名) | 用量 | 用法 | 1クール |
|----------------------------|------------------|--|------------------------|------|
| GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 点滴静注d1,8,15 | 28日 |
| GS | ゲムシタビン S-1 | 1000mg/m ² 60~100mg/day | 点滴静注d1, 8 経口投与d1~14 | 21日 |
| GEM+CDDP | ゲムシタビン シスプラチン | 1000mg/m ² 25mg/m ² | 点滴静注d1,8 点滴静注d1,8 | 21日 |
| Durvalumab + GEM + CDDP | イミフィンジ | 1500mg/body | 点滴静注d1 | 21日 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 点滴静注d1,8 | |
| | シスプラチン | 25mg/m ² | 点滴静注d1,8 | |
| Durvalumab維持療法 | イミフィンジ | 1500mg/body | 点滴静注d1 | 21日 |
| nab-PTX+GEM | アブラキサン | 125mg/m ² | 点滴静注d1,8,15 | 28日 |
| | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 点滴静注d1,8,15 | |
| FOLFIRINOX | オキサリプラチン | 85mg/m ² | 点滴静注d1 | 14日 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | 点滴静注d1 | |
| | イリノテカン | 180mg/m ² | 点滴静注d1 | |
| | 5-FU | 400mg/m ² | 急速静注d1 | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² | 点滴静注d1 | |
| オニバイド + 5FU / LV | イリノテカン(リポソーム化) | 70mg/m ² | 点滴静注d1 | 14日 |
| | レボホリナート | 200mg/m ² | 点滴静注d1 | |
| | 5-FU | 2400mg/m ² | 点滴静注d1 | |
| ラムシルマブ | サイラムザ | 8mg/kg | 点滴静注d1 | 14日 |
| アテゾリズマブ + ベバシズマブ | テセントリク | 1200mg/body | 点滴静注d1 | 21日 |
| | アバスチン | 15mg/kg | 点滴静注d1 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

肝