

その他

	レジメン名	抗がん剤(商品名)	用量	用法	1クール
免疫療法	ニボルマブ	オプジーボ	240mg/body	点滴静注d1	14日
	ニボルマブ	オプジーボ	480mg/body	点滴静注d1	28日
	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注d1	21日
	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	400mg/body	点滴静注d1	42日
骨転移	ゾレドロン酸	ゾレドロン酸	4mg/body	点滴静注d1	21~28日
骨転移	ランマーク	ランマーク	120mg/body	皮下注d1	28日
髄芽腫	VCR	オンコビン	1.5mg/m ²	点滴静注d1,8,15	42日
悪性 神経膠腫	ベバシズマブ	アバステン	10mg/kg	点滴静注d1	14日
悪性 神経膠腫	ベバシズマブ	アバステン	15mg/kg	点滴静注d1	21日
その他	ペムブロリズマブ	キイトルーダ	200mg/body	点滴静注d1	21日
神経内分泌腫瘍					
	STZ weekly	ザノサー	1000mg/m ²	点滴静注d1	7日
	STZ daily	ザノサー	500mg/m ²	点滴静注d1-5	42日